

胰蛋白胨大豆肉汤（TSB）

Tryptic Soy Broth Medium

用于金黄色葡萄球菌 MPN 法测定的增菌培养，也用于一般细菌的培养。

货号：K0268-250g



1、适用范围

应用	类别
增菌/稀释剂	通用

2、原理和用途

胰蛋白胨和大豆胨提供微生物生长所必需的氮源、维生素、矿物质和氨基酸等；葡萄糖提供碳源；氯化钠维持均衡的渗透压；磷酸氢二钾为缓冲剂。

3、配方（g/L）

胰蛋白胨	17.0g
大豆胨	3.0g
葡萄糖	2.5g
氯化钠	5.0g
磷酸氢二钾	2.5g
最终 pH 值（25℃）	7.3±0.2

4、配制方法

称取本品 30.0g，置于 1L 纯化水中。加热搅拌至完全溶解，分装，121℃ 高压灭菌 15min，备用。

5、质量控制

测试项目	标准指标
外观	粉末状
干粉颜色	淡黄色
制备好培养基颜色	淡黄色透明液体
最终 pH 值（25℃）	7.3±0.2

6、微生物测试

根据 GB 标准检测：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌和枯草芽孢杆菌。

质控菌株及编号	生长情况/菌落特征
金黄色葡萄球菌 ATCC6538	生长良好，浑浊度 2
大肠埃希氏菌 ATCC25922	生长良好，浑浊度 2
枯草芽孢杆菌 ATCC6633	生长良好，菌成片状生长
备注：接种计数培养基使用 TSA 参比培养基；	

接种条件：10CFU-100CFU；

培养条件：36±1℃/18-24h。

7、储存条件

常温、密封、干燥、避光处；

保质期三年。

8、参考标准

GB 4789.28-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂质量要求

GB 4789.11-2014 食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验

9、注意事项

称取培养基时，请做好必要的防护措施，以免引起身体不适。

培养基应置于避光（避免日光直射）、干燥处保存，使用后应立即旋紧瓶盖，以免吸潮结块。

使用后的培养基应在 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。

本品不得用于临床检测。

核准日期：2026 年 03 月 18 日

更多产品信息与订购请联系我们！

地址：江苏省南通市兴福路 29 号

电话：0513-85596088

邮箱：info@kinghunt.cn

官网：www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号