肠球菌肉汤

Enterococcus Broth

用于肠球菌的 MPN 法测定及增菌培养。

货号：K0436-250g

1、适用范围

应用	类别
选择性增菌	肠球菌

2、原理和用途

胰蛋白胨、酵母浸膏和牛肉浸膏提供微生物生长所必需的氮源、维生素、矿物质和氨基酸；氯化钠维持均衡的渗透压；细菌水解七叶苷与柠檬酸铁铵中铁离子反应形成黑色的 6,7-二羟基香豆素；柠檬酸钠、牛胆粉和叠氮化钠为选择性抑菌剂，抑制非链球菌的细菌。

3、配方（g/L）

胰蛋白胨	17.0g
牛肉浸膏	3.0g
酵母浸膏	5.0g
牛胆粉	10.0g
氯化钠	5.0g
柠檬酸钠	1.0g
七叶苷	1.0g
柠檬酸铁铵	0.5g
叠氮化钠	0.25g
最终 pH 值（25℃）	7.2±0.2

4、配制方法

称取本品 42.8g，置于 1L 纯化水中，加热搅拌至完全溶解，分装，121℃高压灭菌 15min，备用。

5、质量控制

测试项目	标准指标
外观	粉末状
干粉颜色	淡黄色

制备好培养基颜色	淡黄色
最终 pH 值（25℃）	7.2±0.2

6、微生物测试

根据 GB 标准检测：粪肠球菌、大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌。

质控菌株及编号	生长情况/菌落特征
粪肠球菌 ATCC29212	生长良好，变黑，荧光消失
大肠埃希氏菌 ATCC25922	抑制
金黄色葡萄球菌 ATCC25923	抑制

接种条件：目标菌 10CFU-100CFU；非目标菌 100-1000CFU；

培养条件：35±2℃/24±2h。

7、储存条件

常温、密封、干燥、避光处；

保质期三年。

8、参考标准

GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标

9、注意事项

称取培养基时，请做好必要的防护措施，以免引起身体不适。

培养基应置于避光（避免日光直射）、干燥处保存，使用后应立即旋紧瓶盖，以免吸潮结块。

使用后的培养基应在 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 http://www.kinghunt.cn 下载或随货纸质复印件。

本品不得用于临床检测。

核准日期：2026 年 10 月 12 日

更多产品信息与订购请联系我们！

地址：江苏省南通市兴福路 29 号

电话：0513-85596088

邮箱：info@kinghunt.cn

官网：www.kinghunt.cn

南通凯恒生物微信公众号